

Ако решите да отглеждате сливи

Сортове сливи

Сливата е овошен вид с добра устойчивост през фенофазата на дълбокия покой, като много сортове понасят до минус 30° С. Развива се успешно в месторастения с надморска височина 600-700м. По-големи по площ сливови градини могат да се създават на терени с максимален наклон до 12-15° С.

Препоръчваме за отглеждане следните сливови сортове както следва:

- ◆ С много ран срок на зреене-Рут Гершетер (1-10 юли)
- ◆ С ран срок на зреене-Опал, Чачанска лепотица, Тулеу тимпуриу (15-20 юли)
- ◆ Със среден срок на зреене-Стенлей, Габровска, Стринава, Нансийска мирабелка, Алтанова ренклода (10-30 август)
- ◆ С късен срок на зреене-Кюстендилска синя слива, АНА Шпет (след 1 септември)

Рут Гершетер

Германски сорт. Дървото е умерено растящо. Корона е прибрана, високо кълбовидна, гъста. Родовитостта му е умерена. Сортът е частично самофертилен. Опрашва се от Габровска, Алтанова ренклода, Стенлей, Стринава. В плододаване встъпва рано. Плодовете узряват много рано, в началото на юли. Те са едри, със средно тегло 34 гр., широко овални, несиметрични. Кожицата е дебела, жилава тъмносиня. Плодовото месо е жълто, въз розово, доста плътнo, сочно ароматично, с много добро качество. Костилката е средно едра. Плодовете са подходящи предимно за прясна консумация.

Чачанска лепотица

Сръбска сорт. Дървото е умерено растящо. Короната е пирамидална. Самоопрашва се. Встъпва много рано в плододаване, на третата година от засаждането. Средно едри до едри плодове, средно тегло около 35 гр. Кожицата на плода е тънка, тъмносиньо оцветена със сребристи отенаци. Плодовото месо е жълто-зелено, твърдо, сочно, сладко, с киселина. Плодовете са подходящи за прясна консумация и компоти.

Тулеу тимпуриу

Румънски сорт. Дървото е умерено растящо. Короната е рядка, метловидна. Дървесината на скелетните клони е крехка. Сортът е мъжкостерилен. Опрашва се от Зелена ренклода, Алтанова ренклода, Стенлей, Ана Шпет. В плододаване встъпва рано. Има добра устойчивост на повратни студове и суша. Не е взискателен към почвата. Плодовете узряват в края на юли. Те са много едри, със средно тегло 39 г, с яйцевидна форма. Кожицата е тънка, виолетово-синя. Месото е зелено-жълто, сочно, стегнато, слабо възкисело, с отличен вкус. Костилката е средно едра. Плодовете са отлични за прясна консумация и компот.

Стенлей

Американски сорт. Дървото е умерено растящо. Короната е обратно пирамидална, рядка. Сортът се самоопрашва.

Рано встъпва в бързо нарастващо плододаване. Плодовитостта е голяма и редовна. Толерантен е на шарка, слабо се напада от червени листни петна и ръжда. Силно чувствителен е на ранно и късно кафяво гниене. Задоволително устойчив на суша. Към почвата не е особено взискателен. Плодовете узряват около 20 август. Те са едри, със средно тегло 32 г, с обратно яйцевидна форма. Кожицата е тънка, тъмновиолетово-синя, с многобройни точки и силен налеп. Месото е зелено-жълто, плътнo, със зърнеста структура, сочно, с добри вкусови качества.

Стринава

Този сорт е селектиран в Опитна станция по сливата в гр. Дряново. Дървото е умерено растящо и образува гъста кълбовидна корона. Сортът се самоопрашва. В плододаване встъпва рано и има обилна родовитост. Устойчив е на ранно кафяво гниене и слабо се напада от червени листни петна. Има добра устойчивост на повратни пролетни студове.

Плодовете узряват около 20 август. Те са едри, със средно тегло 29 г, обратнoяицевидни, несиметрични. Кожицата е тъмновиолетово-синя, с восъчен налеп. Месото е жълтеникаво-оранжево, нежно, сочно, сладко, с много добри вкусови качества. Костилката е средно едра. Плодовете са подходящи за прясна консумация, компоти, маринoване и за сушени сливи.

Габровска

Сортът е селектиран в Опитната станция по сливата в гр. Дряново. Дървото е умеренорастящо. Короната е широкопирамидална. Скелетните клони са свързани здраво с водача и не се отчесват. Сортът не се самоопрашва. Подходящи опрашители са Стенлей, Алтанова ренклода, Стринава. В плододаване встъпва много рано. Родовитостта е обилна и редовна. Толерантен е на болестта шарка, напълно устойчив на ръжда, на ранно и късно кафяво гниене. Този сорт е вискателен към влагата, трябва да се отглежда при поливни условия или в месторастения с повече валежи (над 800 мм.) и висока атмосферна влажност. Плодовете узряват около 15 август. Те са едри, със средно тегло 32 г, овални, от страни сплеснати. Кожицата е тъмносиня, с обилен восъчен налеп.

Плодовото месо е светложълтеникаво-кафяво, нежно, сочно, с отлични вкусови качества. Костилката е средно едра. Плодовете са подходящи за прясна консумация, компоти, сушене, сладка, мармалади, нектари, ракия.

Кюстендилска синя слива

Много стар сорт и у нас се отглежда от незапомнени времена. Дървото е силно – до много силнорастящо, образува гъста корона. Проявява голяма студоустойчивост. Слабост на сорта е, че е силно чувствителен на болестта шарка и трябва да се засажда в месторастения, където няма шарка. Сортът се самоопрашва. Родовитостта му е голяма и редовна. Чувствителен е на засушаване. Плодовете му узряват около 10-15 септември. Те са дребни до средноедри от 17 до 22 г, удълженоовални, симетрични. Кожицата е тънка, виолетово-тъмносиня, със силен налеп. Плодовото месо е зеленикаво-жълто, плътно, сочно, сладко, отделящо се от костилката, с превъзходен вкус. Костилката е средно едра. Плодовете са подходящи за прясна консумация, сушене, сладка, мармалади, ракия.

Ана Шпет

Германски сорт. Дървото е умерено растящо и образува обратно пирамидална корона. Сортът се самоопрашва. Плодовете узряват около 15 септември. Отличава се с голяма родовитост. Слабо чувствителен е на шарка и ръжда. Плодовете са много едри, със средно тегло 40 г, продълговатоовални към дръжката и закръглени на върха. Плодовото месо е зеленикаво-жълто, меко, много сочно, сладко, с добър вкус и се отделят от костилката. Плодовете са подходящи за прясна консумация и компоти.

