

Череша – изберете от най-добрите сортове

Плодовете на черешата имат богат и разнообразен химически състав. Ранното узряване на плодовете има голямо значение за укрепване здравето на човека. Черешите възбуждат апетита и усилят перисталтиката на червата с което улесняват храносмилането утоляват жаждата и ободряват. Те са полезни за болните от затлъстяване, бъбреци, захарен диабет и др. Съдържанието на минерални соли е доста голямо особено на калий, което спомага за алкализизирането на кръвта и урината - важно при болни от камъни в бъбреците и възпалителни заболявания на пикочните пътища.

Черешата е растение на умерения климат. Тя не понася много сухите и горещи месторастения. Там плодовете остават дребни а вкусът и качеството им се влошават. Особено неблагоприятни за черешата са месторастенията с лош въздушен дренаж, късни пролетни мразове и слани както и с много влажна и студена пролет, сухо и горещо лято. Отглеждана при благоприятни условия тя е достатъчно устойчива на зимни студове. Плодните и пъпки издържат до минус 24 градуса С. След като премине фазата на дълбок покой, те измръзват и от по-слаби студове. Цветовете се повреждат при минус 2-3 градуса С.

Съществен фактор за рентабилното отглеждане на черешата е избира нето на подходящ високодобивен и качествен сорт.

Бигаро бюрла е създаден във Франция плодовете му узряват около 25 май до 5 юни. Те са едри, тъмночервени, широкосърцевидни със сладко, слабо кисело плътно плодово месо с отлични вкусови качества. Плодовете на сорта са пригодни за механизизирана беритба.

Ранна черна едра е създаден в България. Плодовете му узряват около 25 май до 5 юни. Те са средноедри, тъмно до черночервени, с меко, сладкокисло плодово месо, с добри вкусови качества.

Бинг е създаден в САЩ. Плодовете му узряват около 17-25 юни. Те са едри, тъмночервени с черен нюанс и плътено, сладко-кисло плодово месо, с много добри вкусови качества. Плодовете са пригодни за механизизирана беритба.

Косерска е създаден в Полша. Плодовете му узряват в периода 20-30 юни. Те са едри сърцевидни, тъмни до черно червени, с хрупкаво, светло розово, сладко плодово месо, с много добри вкусови качества. Плодовете са пригодни за механизизирана беритба.

Ван е създаден в Канада. Плодовете му узряват около 20-30 юни. Те са едри, ширококълбовидни, тъмночервени, с хрупкаво, сладко и слабо кисело плодово месо. Те са с много добри до отлични вкусови качества. Плодовете са пригодни за механизизирана беритба.

Ламберт е създаден в САЩ. Плодовете му узряват в периода от 30 юни до 8 юли. Те са едри, широкоудължено-сърцевидни, тъмно до черночервени, с розовочервено, плътено, хрупкаво, сладко, слабокисло плодово месо, с много добри вкусови качества. Плодовете са пригодни за механизизирана беритба.

Бигаро мюро е създаден във Франция. Плодовете му узряват в периода 25 май - 5 юни. Те са едри, тъмночервени, широкосърцевидни, с плътено, сладко-кисло плодово месо, с много добри вкусови качества. Плодовете са относително пригодни за механизизирана беритба.

Конявска черна е създаден в България. Плодовете му узряват в периода 16-22 юни. Те са едри, широкосърцевидни, тъмnochервени до черночервени, с виненочервено, плътно, сладко с освежаваща киселина плодово месо, с добри вкусови качества. Плодовете са пригодни за механизирана беритба.

Българска хрущялка е създаден в България. Плодовете му узряват в периода 18-28 юни. Те са едри широкосърцевидни, тъмnochервени, с плътно, червено, сладко-кисело плодово месо, с много добри вкусови качества. Плодовете са пригодни за механизирана беритба.

Наполеон не е установено къде е създаден. Плодовете му узряват в периода 23 юни - 1 юли. Те са едри сърцевидни, светлочервени върху жълт фон, понякога с по-тъмно червени петна. Изложените на слънце плодове са напълно червени. Плодовото месо е червеникаво, плътно, сладко, с освежаваща киселина и много добри вкусови качества.

Дроганова жълта е създаден в Германия. Плодовете му узряват около 3-10 юли. Те са едри, широкосърцевидни до кълбовидни, кехлибарено жълти, с плътно светложълто, сладко слабо възкисело, съвсем слабо нагарчащо плодово месо, с добри вкусови качества.

Дърветата на черешата обикновено на 4-5 година настъпват в плододаване. Продължителността на живота им е около 40 години. При благоприятни почвено-климатични условия от някои сортове се получават над 100 кг плодове от едно дърво.

Ст.н.с. Илия ПРОДАНОВ

В. Стопанин 49/2002